



Théta Pest
1097 Budapest, Vaskapu u. 17.
thetapest@gmail.com
www.thetapest.hu

Műtési tájékoztató és árajánlat

.....

részére

THÉTA PEST 1097 BUDAPEST VASKAPU U 17
Kapcsolattartó: SZIKINGER BRIGITTA
Telefon: +36-70 9071234
E-mail: thetapest@gmail.com



Fistula (végbél és végbél körüli sipolyok) Lézer-termokoagulációs műtéti megoldása

A sipoly vagy fisztula két természetes üregnek, vagy üreges szervnek kóros összeköttetése, illetve ezeknek rendellenes kivezetése a test felszínére. A sipolyok eredetüket tekintve lehetnek sérülések után visszamaradó, be nem gyógyult sebek, vagy gyulladásos genny-gyülemek (tályog) spontán felfakadásából származóak. Akár külső sérülés után, akár gyulladás után keletkeztek, kezdetben mindig sarjszövet borítja a nyílás belső felszínét, később ezek a felszínek behámosodnak és hegesednek. Leggyakoribb a végbélsipoly, a húgycsősipoly. A végbélsipoly legtöbbször a végbél visszeres csomói (aranyeres csomók)[4] körül keletkező gyulladásnak, vagy a végbél körüli kötőszövet gyulladásának következménye. Szakszerű orvosi beavatkozás nélkül nehezen gyógyul, mert a sipollyal közlekedő üregből folytonosan váladék kerül bele, és ez akadályozza a rés összeforrását. A gyógyulást hátráltathatja, hogy a környező izomzat a sipoly falait folytonosan mozgatja, így a gyógyuláshoz szükséges stabil nyugalmi állapot hiányzik.

A műtét feltételei:

- A páciens teljes szellemi és fizikai jólléte,
- **2 hétnél nem régebbi negatív laboratóriumi,**
- **EKG**
- **mellkasröntgen**
- **A műtéti előleg befizetése**

A beavatkozáshoz elengedhetetlen, hogy meggyőződjünk arról, hogy a páciensnek **semmilyen gyógyszer allergiája nincs- különös tekintettel a helyi érzéstelenítőkre.** Fontos hogy tájékoztasson minket, ha valamilyen véralvadási zavarban szenved, de a beavatkozás miatt nem kell elhagynia a gyógyszereit- még az alvadás gátlókat sem.

Nem végezhető el a műtét,

ha a műtét előtti kivizsgálás olyan kóros laboratóriumi értékeket mutat, amelyek kivizsgálását a beavatkozás hátráltathatná. Ezek kivizsgálása után már nem ellenjavallt a műtét elvégzése.

A műtét előkészületei:

A műtétet megelőző nap könnyű ebéd után már csak folyadékot (levest, gyümölcslevet, teát, stb.) lehet fogyasztani és dohányozni csak éjjelig megengedett.

ÉJFÉLTŐL ENNI, INNI, DOHÁNYOZNI, MÉG RÁGÓGUMIZNI IS TILOS! Ha ettől eltér, a műtét nem végezhető el! Rendszeresen szedett gyógyszerei szedéséről a műtétet megelőző időszakban az operáló orvossal történő egyeztetés során kap információt.

Amennyiben szükséges, gondoskodni kell a műtéti terület(ek) szőrtelenítéséről.

A tájékoztató végén található lista figyelembe vétele

A páciens a szóbeli felvilágosítást követően a műtéti megbízást és beleegyező nyilatkozatot aláírja.



Théta Pest

1097 Budapest, Vaskapu u. 17.

thetapest@gmail.com

www.thetapest.hu

V23 KLINIKA

1125 Budapest, Virányos út 23/D.

2024 Árajánlat

Operáló orvos: Dr. Rozsos István

Tel.: +36/20-941-8603

Beavatkozás: Lézeres aranyér + fistulaműtét

A műtési ár tartalmazza:

- Lézeres - fistula (szükség esetén aranyér is)műtét
- altatás- un. ambuláns, nem intubációs
- a műtési beavatkozás utáni megfigyelést min. 4 óra
- a kötelező első kontrol vizsgálat díjat.

A műtét összköltsége: **790.000 Ft**

Extrém strukturális állapot esetén 20%-os díjkorrekció

Műtétjeink előtt az időpont biztosítása céljából **100.000 Ft** előleget kérünk, melyet a műtét árába beszámítunk. Amennyiben a műtét a páciens hibájából hiúsul meg, az előleg vissza nem téríthető.


Fizetési mód: A fennmaradó összeg fizetése 3 módon történhet:

1. előre utalással, legkésőbb beavatkozást megelőző munkanap reggeléig (banki utalás bizonylatát hozza magával vagy küldje el e-mailben az alábbi email címre: theta.mutet@gmail.hu)
2. a beavatkozás napján reggel, a helyszínen készpénzben
3. a beavatkozás napján reggel, a helyszínen bankkártyával



A műtéti kezelés menete

A végbélsipoly lézeres megszüntetése során csak a sipoly belső, végbélben elhelyezkedő, valamint a külső nyílását metsszük ki. A fennmaradó, gyakran több centiméteren a záróizom rétegei között haladó sipolyjáratba ezt követően egy speciális lézerszálat vezetünk, mely körkörösén leadott energiája által gyakorlatilag „összeheszeszti” a sipolyjárat falát, így teljesen elzárva azt. Ezáltal megszűnik a váladékozás, nincs többet belső „utánpótlás”, a sipolyjárat felszívódik. Ezen technika hatalmas előnye, hogy nem jár kiterjesztett műtéttel, melynek során korábban szét kellett bontani a sipolyjárat teljes környezetét. Gyors, és gyakorlatilag fájdalommentes felépülést vonz maga után. A keletkező minimális sebek mellett a megszokott életvitel már 1-2 nap után folytatható.



ide egy új kép kell

Műtét utáni kezelés, gyógyszerek, életmód otthon, orvosi ellenőrzés:

A műtét után egy óra elteltével lehet inni és amennyiben jól érzi magát 4 óra múlva távozhatsz az intézményünkből, akkor már könnyű étkezés engedélyezett.

A műtét során egy hosszabb géz tampon kerül felhelyezésre. Lehetőleg ezt csak a műtét másnapján az első székeléssel együtt távolítsa el.

A műtétet követő időszakban a táplálkozásnál arra ügyeljen, hogy mind a székrekedést, mind a hasmenést próbálja elkerülni. Ennek érdekében étkezésekhez ajánlott étkezési korpát szedni, valamint a folyadékpótlásra kifejezetten figyeljen oda.

Fájdalom esetén az Ön által már korábban is használt fájdalomcsillapítót alkalmazza (cataflam, advil, panadol, algopyrin, stb.)

A felírt kúpot napi 2x (este és nappal) kell alkalmazni tisztálkodás után, amíg a műtéti terület fájdalmas-ez általában 1 hét.

Detralexet emelt dózisban a műtét másnapjától kell szednie. Első 4 napban napi 6 szemet, 5-7. napig napi 4 szemet kell bevenni.

A műtéti területet az ödéma és a lokális gyulladás miatt tisztálkodás után HYIODIN géllal fertőtlenítsen legalább 1-2 hétig.



Théta Pest

1097 Budapest, Vaskapu u. 17.

thetapest@gmail.com

www.thetapest.hu

Műtét utáni időszakban kímélő életmód javasolt, kerülni kell a fokozott fizikai megterhelést, kifejezetten nehéz súlyok emelését. A beteg el tudja látni magát, mozgásképes marad és szellemi munkát is végezhet. Az orvos határozza meg az egyéb gyógyszerek szükségességét, a kontroll időpontját. A kezelésekről való távolmaradás és az ebből adódó esetleges egészségromlás a beteg felelősségét terheli! A páciens az orvosi utasításokat betartja, kötelező ellenőrző vizsgálatokon megjelenik a kezelő orvos által meghatározott időpontokban. Általánosságban elmondható- hogy a műtét után 2 héttel, majd fél év múlva azt követően pedig évente kötelező az ellenőrzésen való megjelenés.

A beavatkozás következményei:

Közvetlenül a műtét után feszülő fájdalom természetes, ezért a fájdalomcsillapítást azonnal megkezdjük. A műtégi terület beödémásodhat, ami a gyógyulási folyamat természetes része. Ezen kívül székelés után gyenge vérzés a műtét utáni 1-2 hétben előfordulhat.

Milyen tünetek észlelésekor kell azonnal a kezelőorvoshoz fordulni:

A műtét után fellépő láz, nagyfokú vérzés esetén azonnal fel kell keresni az operáló orvost.

Lista:

1. 2 hétnél nem régebbi labor eredmény
2. 2 hétnél nem régebbi EKG eredmény
3. Árajánlat
4. Altatás előtti nap délig lehet szilárd táplálékot fogyasztani, éjfél után enni, inni, dohányozni már NEM SZABAD!
5. Kényelmes ruhát, papucsot hozhat magával.
6. Rendszeresen szedett gyógyszereket az előzetes megbeszélés alapján kell bevenni!
7. Műtégi területek szőrtelenítése (amennyiben szükséges)
8. Műtégi előleg elutalása

Köszönjük megtisztelő bizalmát!

Dr. Rozsos István

Sebész és érsebész szakorvos

További kérdéseivel, melyekre itt nem kapott választ forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken

E-mail: thetapest@gmail.com, theta.mutet@gmail.com

Kapcsolattartó:

Szikinger Brigitta

+36 70 9071234