



Vadácsi Kft. Sebészeti, érsebészeti magánrendelés

Tájékoztató az injekciós visszérkezelésről

(szkleroterápia, hab szkleroterápia)

Általános tudnivalók:

A scleroterápia a visszerek kezelésére szolgáló, minimálisan invazív eljárás. Lényege, hogy a kezelés során az érbe beadott kémiai anyag (aethoxysclerol) enyhe, steril gyulladást vált ki, mely az érfal hegesedéséhez (szklerotizáció) vezet: a véna falait egymáshoz tapasztja, ezáltal az adott érszakaszt kizárja a keringésből. A kezelt érszakasz kb. 6-8 hét alatt teljesen felszívódik.

Beavatkozás előtti teendők:

Kérjük a beavatkozásra kényelmes, laza ruházatban érkezzen, esetleg sportcipő vagy papucs viselése javasolt. A beavatkozást megelőzően fogyasszon bőségesen folyadékot. Amennyiben rendszeres vérhígító gyógyszeres kezelés alatt áll, kérjük a beavatkozás előtt jelezze orvosainknak! Kérjük a kezelést megelőzően kerülje testápoló krém / gél használatát!

Beavatkozás menete:

A beavatkozás álló vagy fekvő helyzetben történik. A kezelés során a tágult visszert vékony tűvel megszúrjuk, majd a szklerotizáló anyagot a tűn keresztül a vénába juttatjuk. A visszerek számától - kiterjedtségétől függően kevesebb-több tűszúrásra is szükség lehet. A kezelés végén a végtagra kompressziós fáslit helyezünk, amely a visszerek falát 12-16 órán keresztül folyamatosan összetapasztva tartja. Egy kezelés során végtagonként 2 ml, összesen maximum 3-4 ml hatóanyag adható be a vénákba, ezért előfordul, hogy kiterjedt visszerek esetén több kezelésre is szükség lehet.



WWW.MEROVA.EU
az egészségplatform



Szkennelje le!





Hab (foam) szkleroterápia

A szkleroterápia egy speciális formája, mely során a a szklerotizáló anyagot 1:4 arányban levegővel / szén-dioxiddal elegyítjük, ezáltal egy sűrű, viszkózus hab jön létre. Ezt a habot a vénába juttatva erőteljesebb érfal hegesedés váltható ki, mintha csak folyadék formában alkalmaznánk, ezáltal a „hab”-kezelés nagyobb, akár 1 cm-nél erősebb oldalágak, vagy akár visszeres főtörzsek kezelésére is alkalmazható. A kezeléshez műtői háttér nem szükséges, járóbetegként is elvégezhető, ultrahang alkalmazása azonban – főleg főtörzsi visszerek kezelése esetében – mindenképpen indokolt.

Ellenjavallatai: Pitvari sövényhiány (foramen ovale aperta), súlyos, generalizált érszűkület, akut vénagyulladás, akut mélyvénás trombózis, trombózishajlamot fokozó genetikai eltérések.

Beavatkozás után:

A kezelés követően 15-20 perc séta javasolt. Rendszeres testmozgás, sporttevékenység már a kezelés másnapján végezhető. Ha nem sportol rendszeresen, naponta egyszer alsó végtagi vénás torna végzése feltétlenül ajánlott. A kezelés másnapjától 2-4 hétig kompressziós harisnya viselése (általában 140 den erősségű), ill. a kezelt területek Solvena / Dimovena géles kezelése szükséges.

Egyéb visszérkezelési módszerek:

Léteznek alternatív kezelési módszerek is a visszerek kezelésére, mint például a konzervatív kezelés (különböző típusú kompressziós harisnyák, visszérkrémek, vénafal erősítő-, ill. mikrokeringést javító gyógyhatású készítmények), a hagyományos sebészeti műtéti eltávolítás (varicectomy), a hőkezeléssel (lézer-, rádiófrekvenciás-, ill. mikrohullámú visszérkezelés) történő visszérműtétek és a ragasztásos visszérkezelés (VenaSeal).





 Előforduló mellékhatások a szkleroterápia során / után:

Bőrpír, lila foltok - A kezelt terület átmenetileg vörös és viszkető lehet, a befecskendezés helyén esetleg duzzanat vagy lila foltok alakulhatnak ki, melyek általában 2-3 hét alatt eltűnnek.

Átmeneti hiperpigmentáció - A kezelt véna szakaszosan megtarthatja, „csapdába ejtheti” a vért, ami érzékeny lila csomók formájában jelenik meg, és barna elszíneződést hagyhat a kezelés helyén 3-4 hónapig. Ilyen esetekben apró tűszúrásból a csapdába ejtett vér eltávolítható, ezáltal az elszíneződés is megelőzhető.

Matting / Pír - A kezelés helyén alkalmanként új finom pókháló-erek jelenhetnek meg, melyek megjelenése hasonló pl. a zúzódáshoz. Kezelés nélkül általában 3-6 hónapon belül eltűnnek, ahogy az eredeti kezelt ér felszívódik. Nagyon ritkán megmaradhatnak, ilyenkor újabb szkleroterápiával, vagy cutan lézerrel eltüntethetőek.

Allergiás reakció - Nagyon ritkán előfordulhat, hogy a páciens allergiás reakciót mutat a szklerotizáló anyagra. Ennek kockázata magasabb azoknál a pácienseknél, akiknek súlyos allergiás előzményeik vannak.

A kezelt visszér gyulladása – fájdalmas, piros csomók a kezelt területnek megfelelően – kompressziós harisnya, jegelés alkalmazása mellett néhány nap alatt megszűnik; ellenkező esetben kezelőorvosával konzultáljon!

Bőrfekély. Nagyon ritka esetekben a kezelés helyén hólyag, majd apró fekély alakulhat ki. A gyógyulást követően (több hónap is lehet) általában heg marad vissza.

Migrén/látászavarok - gyakori, ha esetleg migrénes kórelőzménye van, de általában 20 percen belül megoldódik.

Mélyvénás trombózis (DVT) Nagyon ritka szövődmény. Vérrög alakul ki a mélyvénákban (ez nem azonos a kezelt visszérrel). Fő veszélye a tüdőembólia kialakulása. Magasabb a kockázata korábbi mélyvénás trombózis esetén. Kompressziós harisnya viselése és a napi rendszeres séta / testmozgás mellett a trombózis rizikója minimalizálható.





Szkleroterápia Beleegyező Nyilatkozat

Ügyfél

Én, Név.....Születési dátum.....
kijelentem, hogy kezelőorvosom részletesen és számomra érthető módon tájékoztattott az állapotomról, a javasolt szkleroterápiás eljárásról és annak esetleges kockázatairól. Megvitatta velem az egyéb kezelési lehetőségeket és tájékoztattott a kezelés elmulasztásának lehetséges következményeiről is. A kezelésről szóló írásos tájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat tudomásul vettem, a kezeléssel kapcsolatban felmerülő kérdéseimre kielégítő választ kaptam. Az aláírással felhatalmazom kezelőorvosomat és munkatársait, hogy a lábamban lévő kóros visszértágulatokat (hab) injekció adása, ragasztás vagy egyéb elzárósos technikák révén megszüntessék, annak érdekében hogy a lábammal kapcsolatos panaszaim enyhüljenek, megszűnjenek, továbbá a lábaim esztétikai megjelenése is javuljon. Az aláírással beleegyezek abba, hogy a kezelésről személyazonosságom tiszteletben tartásával, név és arc nélkül fénykép / videó /ultrahang felvétel készülhet, melyet kezelőorvosom orvosi dokumentáció ill. oktatás vagy kutatás céljából felhasználhat. Az aláírással tudomásul veszem, hogy az orvostudomány és a sebészet nem egzakt tudomány, így 100% megoldás nem minden esetben garantálható.

Dátum:

Ügyfél aláírása

Kezelőorvos: Kijelentem, hogy ügyfelemet személyesen felvilágosítottam az állapotáról, a lehetséges kezelési módszerekről, azok kockázatairól, ill. a kezelés elmaradásának várható következményeiről. Ezekkel és a jelen tájékoztató dokumentumban leírtakkal kapcsolatosan elegendő időt adtam arra, hogy kérdéseket tegyen fel, amelyekre úgy gondolom, hogy kielégítően válaszoltam a páciens elégedettségére.

Dátum:

Dr. Gadácsi Melinda

Aláírás

